

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

VETAL **ENTOVAC-P™**

Enjeksiyonluk Süspansiyon

Cl.perfringens tip C ve Cl.perfringens tip D anakültürü ile hazırlanmış inek, dana, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlakların Enteretoksemi (Pulpy kidney ve Struck = Braxylike disease) hastalığına karşı koruyucu konsantre toksoid, anakültür, polivalan kombine aşı

BİLEŞİMİ

1 doz aşıda;

Etkin Madde

Cl.perfringens tip C β- toksoid ≥2,5 IU/ml β- antitoksini

Cl.perfringens tip D ε- toksoid ≥2,5 IU/ml ε-antitoksini

*21 gün ara ile önce 1 ml sonrada 0.5 ml doz aşı uygulaması yapılan tavşan karma serumu antitoksin düzeyi.

Adjuvan

Aliminyum Hidroksit Jeli % 20

Saponin % 0,1

Yardımcı Madde:

Fenol (koruyucu) ≤5 g/L

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Sığırlar için inaktif bakteriyel aşılar, Koyunlar için inaktif bakteriyel aşılar, Keçiler için inaktif bakteriyel aşılar
ATCvet Code: QI02AC, QI04AC, QI03AC

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

İnek, dana, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklarda Enteretoksemi (Pulpy kidney ve Struck = Braxylike disease) hastalığına karşı koruyucu amaçlı kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Entovac P, inek, dana, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklarda 2 doz, olarak 21 gün arayla deri altı (SC) olarak aşağıdaki uygulama tablosuna göre yapılır.

Bağışıklık süresi 6 aydır.

Hayvan türü	İlk uygulama	Rapel doz
İnek-Dana	2 ml	2 ml
Buzağı	1 ml	1 ml
Koyun- Keçi	1 ml	0,5 ml
Kuzu-Oğlak	1 ml	0,5 ml

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Uygulamada asepsi ve antisepsi kurallarına kesinlikle uyulmalı, iğne ve enjektörlerin tekrar kullanımından kaçınılmalıdır. Her hayvan ayrı bir enjektör veya iğne ucu kullanılarak aşılanmalıdır. Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.Etki süresi 15-21 gündür. Buzağının ilk 5 gün ağır sütünü tam olarak almaları sağlanmalıdır. Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanımı

Doğumuna 6 hafta kalanlara ve enteretoksemi belirtileri başlamış olan hayvanlara yapılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Bazı hayvanlarda aşı enjeksiyon yerinde adjuvanta bağlı hafif şişkinlik oluşabilir. Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik reaksiyonların gözlemlendiği durumlarda, antialerjik, adrenerjik ve antihistaminik preparatlarla kontrol altına alınabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Herhangi bir tıbbi ürünle karıştırılmaması önerilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

İnek, dana, buzağı, koyun, kuzu, keçi ve oğlaklarda normal dozun 2 katı ile yapılan aşılamaların olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

0 (Sıfır) gün

KONTRENDİKASYONLAR:

Doğumuna 6 hafta kalanlara ve enteretoksemi belirtileri başlamış olan hayvanlara yapılmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

- Enjeksiyon yeri antiseptiklere temizlendikten sonra aşı iyice çalkalanarak uygulanmalıdır.
- Aşı uygulaması yetkili veteriner hekimler veya veteriner hekim denetimi altında veteriner sağlık teknikerleri tarafından yapılmalıdır.
- İyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyaliyle temasından kaçınılmalıdır.
- Aşı naklinde soğuk zincire mutlaka uyulmalıdır.

MUHAFAZA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ:

Aşı karanlıkta, +2°C / +8 °C 'de saklanmalı, dondurulmamalı ve güneş ışığından korunmalıdır. Satılmak üzere paketlenmiş veteriner tıbbi ürünün raf ömrü 24 aydır. Ambalajı açılan ürünler 6 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilir. İmha işlemi iki aşamada gerçekleştirilir. Otoklavda 1.2 atm basınç altında 121 °C 'de 1 saat süreyle imha edilir. Son işlem olarak biyolojik atık merkezine veya foseptik çukurlarına gönderilir. Saha şartlarında derin olarak toprağa gömülür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

Entovac-P, 15, 50 ve 100 ml hacimli tip II kahverengi cam şişelerde, inek-dana için 3, 12 ve 25 doz olarak, koyun-keçiler için 10, 33 ve 66 doz olarak ambalajlanır. Şişeler bromobutil plastikten yapılmış tıpa ve alüminyum kapakla kapatılmıştır. Aşı adeti kadar prospektüs ilave edilmiş çoklu strafor kutuda pazara sürülür. Tüm ambalaj formları aynı anda pazara sürülmeyebilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:

PAZARLAMA İZİN SAHİBİNİN ADI VE ADRESİ:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Petrol Mah. 14.Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE

Telefon : +90 416 223 20 30

Faks : +90 416 223 14 56

e-mail: vetal@vetal.com.tr

web: www.vetal.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Petrol Mah. 14.Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE

Telefon : +90 416 223 20 30

Faks : +90 416 223 14 56

e-mail: vetal@vetal.com.tr

web: www.vetal.com.tr