



Enterotoksemi, Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Malignant Ödem, Bradzot, Yanıkara, Tetanoz, Pseudotuberküloz (Kazeöz Lenfadenit) ve Salmonellozis Enfeksiyonlarına karşı Konsantre Toksoid-Anakültür Polivalan Aşı

Bileşimi:

1 doz (2 ml) aşıda;

Aktif Maddeler:

<i>C.pseudotuberculosis</i>	: ≥2,3 ELISA ünit antikor ¹
<i>S.typhimurium</i>	: ≥1,5 log LD ₅₀ koruma ²
<i>Cl.perfringens beta toksoid</i>	: ≥10 IU /ml β- antitoksini ³
<i>Cl.perfringens epsilon toksoid</i>	: ≥5 IU /ml ε-antitoksini ³
<i>Cl.novyi alfa toksoid</i>	: ≥3,5 IU /ml α- antitoksini ³
<i>Cl.septicum alfa toksoid</i>	: ≥2,5 IU /ml α- antitoksini ³
<i>Cl.tetani toxoid</i>	: ≥2,5 IU/ml tetanoz antitoksini ³
<i>Cl.chauvoei</i>	: ≥%90 koruma ⁴ yanıtı oluşur.

¹ Aşılanmış koyun kan serumundaki ELISA ünit antikor düzeyi

² Epruve edilen ağılı ve kontrol grubu farelerin LD₅₀ düzeyleri arasındaki fark

³ Aşılanmış tavşanlarda kan serumundaki antitoksin düzeyi

⁴ Epruve edilen kobaylarda koruma düzeyi

Adjuvant:

Aluminyum hidroksit	400 mg
Saponin	4 mg

Yardımcı Madde:

Fenol : 4.8 mg

Kullanım Sahası / Endikasyonlar:

SÜPERVAC–9 Aşısı; sığır, koyun, keçi, buzağı, kuzu ve oğlaklarda Enterotoksemi (Hemorajik ve Nekrotik Enteritis, Yumuşak Böbrek Hastalığı, Struck, Kuzu Dizanterisi), Enfeksiyöz Nekrotik Hepatitis, Malignant Ödem, Bradzot, Yanıkara, Tetanoz, Pseudotuberküloz (Kazeöz Lenfadenit) ve Salmonellozis (Buzağı Gastroenteritisi) enfeksiyonlarına karşı korumada endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Aşı; koyun, keçi, kuzu ve oğlaklarda koltuk altı yünsüz ve hareketsiz bölgeye; sığır ve buzağılarda ise boynun son 1/3'üne derialtı (s.c.) yolla uygulanır. Uygulanmadan önce aşı çalkalanmalıdır. Aşısız annelerden doğmuş buzağı, kuzu ve oğlaklar zorunlu durumlarda doğum sonrası 2. haftadan itibaren, aşıllı annelerden doğmuş buzağı, kuzu ve oğlaklar ise 2. aydan itibaren aşılanmalıdır. Önceden aşılanmamış hayvanlara 21-28 gün sonra ikinci aşılama yapılır. Daha önceden aşılanmış hayvanlara 6 ayda bir aşılama yapılmalıdır.

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Özel Uyarılar:

- Aşı zorunlu olmadıkça 2 aydan küçük buzağı, kuzu ve oğlaklara uygulanmamalıdır. 2 aylık sürenin enfeksiyon riski açısından güvencede olabilmesi için yeni doğanların aşıllı annelerden doğmuş olmaları gerekir.
- Aşı yalnızca sağlıklı hayvanlara uygulanır.
- Aşı, kullanım öncesi ve kullanım süresince aralıklı olarak çalkalanmalıdır.
- Aşı uygulamaları esnasında asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır. Aşı uygulama kurallarına uyulmadığı taktirde kontaminasyona bağlı apseleşmeler görülebilir.
- Uygun koşullarda muhafaza edilmemiş, soğuk zinciri bozulmuş ve çalkalandığında homojen bir süspansiyon görünümü almayan aşılar kullanılmamalıdır.

Gebelik ve laktasyon periyodunda kullanımı:

Gebe hayvanlar doğumdan 1 ay öncesine kadar kullanabilir. Aşının inaktif olması nedeniyle laktasyon döneminde kullanımında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

İstenmeyen Etkiler:

Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik şok reaksiyonlarının gözlemlendiği durumlar gelişebilir. Bu durumda oluşan tablo; antialerjik, adrenerjik ve antihistaminik preparatlarla kontrol altına alınabilir. Enjeksiyon bölgesinde uygulama sonrası görülen, apseleşmeyen ve birkaç hafta içinde kaybolan şişlikler normal aşı reaksiyonudur.

İstenmeyen Etkilerin Sıklığı Aşağıdaki Gibidir:

Çok sık (10 hayvandan 1 ve üzerinde hayvanda görülüyorsa)
Sık (100 hayvandan 1-9 hayvanda görülüyorsa)
Sık olmayan (1.000 hayvandan 1-9 hayvanda görülüyorsa)
Ender (10.000 hayvandan 1-9 hayvanda görülüyorsa)
Çok ender (10.000 hayvandan 1'den az sayıda hayvanda görülüyorsa)

İlaç Etkileşimleri:

Bu aşının diğer tıbbi ürünlerle uyumluluğu üzerinde bilgi yoktur. Diğer tıbbi ürünlerle kullanıldığında (aynı gün ya da farklı zamanlarda) bu ürünün güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler ve Antidot:

Uygulama dozunun 2 katı doz ile her bir hedef hayvanda yapılan yüksek doz çalışmalarında anormal lokal ve sistemik reaksiyon gözlenmemiştir.

Gıda Değeri Olan Hayvanlarda Yasal Arınma Süresi:

Sıfır (0) gün.

Kontrendikasyonlar:

Aşı, gebeliğin son ayı hariç, gebeliğin tüm dönemlerinde uygulanabilir. Hasta veya inkübasyon periyodundaki hayvanlar aşılanmamalıdır.

Genel Uyarılar:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Uygulayıcının Alması Gereken Önlemler ve Hekimler İçin Öneriler:

- Aşı uygulamaları sadece Veteriner Hekim veya Veteriner Hekim gözetimindeki Teknisyenler tarafından yapılır.
- Uygulama sırasında koruyucu ekipmanlar (önlük, eldiven gibi) kullanılır.
- İyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyali ile temasından kaçınılmalıdır.
- Aşı uygulayan veya hayvan zaptında görev yapan kişilerin yaralanması veya iğne batması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek doktor muayenesi yapılmalıdır.
- Aşının uygulama sahasına dökülmesi durumunda, dökülen yer dezenfekte edilmelidir.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü:

+2°C/+8°C'de karanlıkta muhafaza edilir. Güneş ışığından korunmalıdır. Dondurmayınız. Raf ömrü 2 yıldır. Açılan aşı şişeleri 6-8 saat içerisinde tüketilmelidir.

Kullanım Sonu İmha ve Hedef olmayan Türler İçin Uyarılar:

Kullanılmamış ya da arta kalan ürünler tıbbi atık mevzuatı hükümleri gereği işlem görmelidir. Hedef olmayan türler için bir risk teşkil etmemektedir.

Ticari Takdim Şekilleri:

Karton kutu içerisinde, butil tıplar kapatılmış 20, 50 ve 100 ml'lik tip II cam ya da 20, 50, 100, 250 ve 300 ml'lik polipropilen plastik şişelerde ambalajlanmıştır. Tüm ambalaj boyutları pazara sürülmeyebilir.

Prospektüsün Onay Tarihi: 10.08.2020

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Paz. İzn. Tar. ve No.: 10.08.2020

Pazarlama İzin Sahibinin Adı - Adresi:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Petrolosb Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRKİYE

Telefon: +90 416 223 20 30 **Faks:** +90 416 223 14 56

e-mail: vetal@vetal.com.tr

web: www.vetal.com.tr