

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

POLIVAC-CI®

Enjeksiyonluk Süspansiyon



Konsantre Toksoid-Anakültür Polivalan Aşı

BİLEŞİMİ:

POLIVAC CI, *Cl. perfringens* Tip B, C, D, *Cl. novyi* Tip A, *Cl. septicum* ve *Cl. chauvoei* anakültürü ile hazırlanan inaktif, toxoid bir aşıdır.

Bir doz (2ml) aşı;

Cl.perfringens Tip B, C, D toksoid: ≥ 10 IU /ml β - Antitoksini
Cl.perfringens epsilon toksoid: ≥ 5 IU /ml ϵ -Antitoksini
Cl.novyi Tip A toksoid : $\geq 3,5$ IU /ml α - Antitoksini
Cl.septicum toksoid : $\geq 2,5$ IU /ml α - Antitoksini
Cl.chauvoei anakültür : $\geq$ %100 koruma yanıtı oluşur.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR:

Koyun ve keçilerin Enterotoksemi (Pulpy kidney, struck ve Braxylike disease), Enfeksiyöz Nekrotik Hepatit, Malignant ödem; kuzuda kuzu dizanteri; buzağıda gastroenteritis, Enterotoksemi, gazlı gangren; sığırlarda yanıkara ve bradzet hastalığına karşı koruyucu amaçla uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

- Koyun ve keçilerde; ilk uygulamada 2 ml deri altı yolla yapılır. 21 gün sonra doz tekrar edilir. 6 ayda bir tekrarlanır. Aşısız anneden doğan kuzulara 1 ml deri altı yolla yapılır, doz 21 gün sonra tekrar edilir.
- Yetişkin sığırlarda; ilk uygulamalarda 4 ml derialtı yolla yapılır. 21 gün sonra doz tekrar edilir. 6 ayda bir tekrarlanır.
- 3 aydan küçük buzağılarda; ilk uygulamalarda 2 ml derialtı yolla yapılır. Doz 21 gün sonra tekrar edilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Aşı, 3-4 haftadan küçük kuzulara uygulanmamalıdır. Ferdi olarak lokal ve genel aşı reaksiyonları görülebilir. Aşılama öncesi ve sonrası hayvanlar yaklaşık bir saat dinlendirilmelidir. Uygulama esnasında hayvanlar zapturapt altına alınması önerilir. Aşılar kullanmadan önce ve kullanım sırasında çalkalanmalıdır. Steril enjektör ve iğneler kullanılmalıdır. Enjeksiyon bölgesinin

temiz ve kuru olmasına özen gösterilmelidir. Uygun şartların sağlanmadığı durumlarda kontaminasyona bağlı abseleşmeler olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Uygulamada asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır. Her hayvana, ayrı bir enjektör veya iğne ucu kullanılarak aşı uygulanmalıdır.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanımı

Gebe hayvanlar doğumdan 1 ay öncesine kadar kullanılabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER:

Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafaktik şok reaksiyonlarının gözlemlendiği durumlar gelişebilir. Bu durumda oluşan tablo; antialerjik, adrenerjik ve antihistaminik preparatlarla kontrol altına alınabilir. Enjeksiyon bölgesinde uygulama sonrası görülen, apseleşmeyen ve birkaç hafta içinde kaybolan şişlikler normal aşı reaksiyonudur.

İstenmeyen etkilerin sıklığı aşağıdaki gibidir;

Çok Sık	(10 hayvandan 1 ve üzerinde hayvanda görülüyorsa)
Sık	(100 hayvandan 1-9 hayvanda görülüyorsa)
Sık Olmayan	(1.000 hayvandan 1-9 hayvanda görülüyorsa)
Ender	(10.000 hayvandan 1-9 hayvanda görülüyorsa)
Çok Ender	(10.000 hayvandan 1'den az sayıda hayvanda görülüyorsa)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının diğer aşılarla uyumluluğu üzerine bilgi bulunmamaktadır. Diğer aşılarla birlikte kullanıldığında (aynı gün ya da farklı zamanlarda) bu ürünün güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Diğer tıbbi ürünlerle bir arada ya da karıştırılarak kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Uygulama dozunun 2 katı doz ile her bir hedef hayvanda yapılan yüksek doz çalışmalarında anormal lokal ve sistemik reaksiyon gözlenmedi. Beden ısıları dahil olmak üzere tüm bulgular limitler dahilindedir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI:

Sıfır (0) gün

KONTRENDİKASYONLAR:

Herhangi bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Bu ürün, yasal yetkililerince uygulanır ve takip edilir. Veteriner Hekim veya Veteriner Sağlık Teknisyenleri dışında yapılan uygulamalar ve sonuçlarından ÜRETİCİ firma kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

MUHAFAZA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ:

POLIVAC CI ; +2 °C / +8 °C aralığında karanlık ortamda muhafaza edilir. Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Satılmak üzere paketlenmiş veteriner tıbbi ürünün raf ömrü 24 aydır. Ambalajı açılan ürünler 8 saat içerisinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmış veya arta kalan ürünler otoklavda 121 °C'de 30 dakika imha için tutulduktan sonra foseptik çukurlarına gönderilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

POLIVAC CI Enjeksiyonluk süspansiyon tekli karton kutu içerisinde 100 ml ve 200 ml'lik tip II kahverengi cam ya da 20, 50, 100 ve 250 ml'lik

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ / ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Petrol Mah. 14.Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi

Adıyaman /TÜRKİYE

Telefon : +90 416 223 20 30 Faks : +90 416 223 14 56

e-mail: vetal@vetal.com.tr web: www.vetal.com.tr

polipropilen plastik şişelerde ambalajlanmıştır. Şişeler bütül plastikten yapılmış tapa ve alüminyum kapakla kapatılmıştır. Tüm ambalaj formları aynı anda pazara sürülmeyebilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 10.11.2004