

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.



Enjeksiyonluk Süspansiyon

ANTHRAX AŞI

Bacillus anthracis 34 F₂ suşu ile hazırlanan sığır, at, koyun, keçi ve domuzların Anthrax hastalığına karşı koruyan sporlu canlı attenüe aşı

BİLEŞİMİ:

1 ml'de;	
Bacillus anthracis 34 F ₂ suşu	10 ⁷ /ml canlı spor.
Saponin	% 0,1 w/v
Fizyolojik tuzlu su- gliserin	%50 v/v

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: Canlı bakteriyel aşılar
ATC vet kodu: QI02AE04

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Sığır, at, koyun, keçi ve domuzlarda anthrax hastalığına karşı koruma amaçlı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşağıdaki uygulama şeması önerilir:

Büyükbaş hayvanlara (at, sığır, deve)	1ml
Koyun, keçi, domuz	0,5ml
Tay, dana, malak	0,5ml
Kuzu ve oğlak(2-6 aylık)	0,25ml

Büyükbaş hayvanlara boynun yan yüzünün orta kısmına veya omuz gerisine, koyunlarda arka bacak iç kısmına, keçilerde kuyruk altına ve domuzlarda kulağın arka yüzüne deri altı verilir. Kıvrıcık koyunlarda kuyruk altına da enjekte edilebilir. Enjeksiyon yeri mümkün olduğu kadar eklemlerden uzak olmalıdır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Aşılama sırasında asepsi ve antisepsi kurallarına dikkat edilmelidir. Aşı mutlaka derialtı uygulanmalıdır. Aşılama öncesi ve sonrası antibiyotik uygulaması bağıışıklığı olumsuz yönde etkiler.

Gebelik, Laktasyon ve Yumurtlama Döneminde Kullanımı

Yüksek ateşli ve gebeliğin son dönemindeki hayvanlara uygulanmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Aşı uygulamasını takip eden 24-48 saat içinde hafif ateş ve geçici topallık görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Aşının uygulanmasından en az 3 hafta önce ve sonrasında başka bir aşı uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Uygulama dozunun 2 katına kadar herhangi bir yan etki görülmez.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Aşılana hayvanlar 6 haftadan önce mezbahaya sevk edilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLAR

Yüksek ateşli ve gebeliğin son dönemindeki hayvanlara uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

- Sadece sağlıklı hayvanlar aşılanmalıdır.
- Aşılama sırasında aşı şişesi düzenli aralıklarla çalkalanmalıdır.
- Aşı uygulaması yetkili veteriner hekimler veya veteriner hekim denetimi altında veteriner sağlık teknikerleri tarafından yapılmalıdır.
- İyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyaliyle temasından kaçınılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Aşı karanlıkta, +2°C / +8 °C 'de saklanmalı, dondurulmamalı ve güneş ışığından korunmalıdır. Satılmak üzere paketlenmiş veteriner tıbbi ürününün raf ömrü 24 aydır. Ambalajı açılan ürünler 6 saat içinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

İmha işlemi iki aşamada gerçekleştirilir. Otoklavda 1.2 atm basınç altında 121 °C 'de 1 saat süreyle imha edilir. Son işlem olarak biyolojik atık merkezine veya foseptik çukurlarına gönderilir. Saha şartlarında derin olarak toprağa gömülür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Butil plastikten yapılmış bir tıpa ile kapatılmış 15 – 50 ml amber renkli tip II cam şişelerde ve bromobutil plastikten yapılmış tıpa 25 ml, 50 ml ve 100 ml beyaz/transparan polipropilen(PP) şişelerde ambalajlanmıştır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 21.06.2023

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:10.11.2004

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Petrol OSB Mah. 14.Cad. No:1/1 Organize Sanayi Bölgesi

Merkez/ADİYAMAN

ÜRETİCİ FİRMA ADI VE ADRESİ:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Gölbaşı Karayolu Üzeri 7. Km Adıyaman

Telefon : +90 416 223 20 30

Faks : +90 416 223 14 56

e-mail : vetal@vetal.com.tr

web : www.vetal.com.tr