

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır



500 ml
Enjeksiyonluk
Emülsiyon

Levreklerde *Listonella anguillarum* serotip O1 (vibriosis), *Photobacterium damsela* subsp. *piscicida* (pasteurellosis) ve *Aeromonas veronii* enfeksiyonlarına karşı inaktif enjeksiyonluk aşı

BİLEŞİMİ

1 doz (0,1 ml) aşıda:

Etkin Madde:

Formalin ile inaktive edilmiş;

<i>Listonella anguillarum</i> (serotip O1)	RPS≥80
<i>Photobacterium damsela</i> subsp. <i>piscicida</i>	RPS≥70
<i>Aeromonas veronii</i>	RPS≥70

RPS: Rölatif Yaşama Yüzdesi

Adjuvant:

Mineral Yağ

Yardımcı Maddeler:

Fenol (koruyucu) ≤0,5 mg

IMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik grup: İnaktive edilmiş bakteri kültürleri ile aşı.

ATCvet kodu: Q110X

Koruma süresi 4087 derece/gün olarak belgelenmiştir.

Koruma başlangıcı 480 derece/gün olarak belgelenmiştir.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Levreklerde (*Dicentrarchus labrax*) vibriyosis (*Listonella anguillarum* O1), Pasteurellosis (*Photobacterium damsela* subsp. *piscicida*) ve *Aeromonas* (*Aeromonas veronii*)'ın sebep olduğu klinik semptom ve ölümleri önler.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşağıdaki aşılama şeması önerilir:

12 gram ve üstü boyda olan her bir balığa, karın boşluğuna (intraperitoneal i.p) 0,1 ml enjekte edilir.

Pelvik yüzgeçlerin uçları ile karın orta çizgisi arası aşılama yapılması için uygundur.

İğne, balığa girdiği açı ile çıkarılmalıdır. Balık boyuna uygun çap ve uzunlukta iğne kullanıl-

malıdır. İğnenin ucu karın duvarından içeriye 1,5 mm kadar geçmelidir. Aşının tüm dozu karın boşluğuna bırakılmadan iğne çekilmemelidir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Herhangi bir hastalık belirtisi gösteren balıklar aşılanmamalıdır. Daha önce bu aşıyla aşılanan balıklar aşılanmamalıdır. Uygulama esnasında uygulamanın kalite kontrolü veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır.

Uygulayıcı tarafından birbiri ardına çok hızlı ve kontrolsüz yapılan aşılamalar, aşı dozunun tamamının karın boşluğuna zerk edilmemesi veya aşının kas içinde kalması gibi sonuçlara sebep verebilir.

Stres faktörlerine (yeni kafes değişimi) yeni maruz bırakılmış balıklar aşılanmamalıdır. Balıkların uygulamadan 24 saat öncesinde yemlenmesinin kesilmesi gereklidir. Uygulama öncesinde balıkların bağırsaklarında yem olup olmadığı kontrol edip balıkların aç olduğundan emin olunmalıdır. Yalnız sağlıklı balıklar aşılanmalıdır. Herhangi bir hastalık belirtisi gösteren ve stres faktörlerine (yeni kafes değişimi) yeni maruz bırakılmış balıklar aşılanmamalıdır. Uygulama esnasında uygulamanın kalite kontrolü bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır.

Kalibre edilmiş aşı tabancaları ve aşılama makinaları kullanılır. Otomatik aşı enjektörü kullanmak uygulayıcı tarafından birbiri ardına çok hızlı ve kontrolsüz yapılan aşılamaları, aşı dozunun tamamının karın boşluğuna zerk edilmemesi ve aşının kas içinde kalması gibi sonuçları azaltacaktır.

Gebelik, Laktasyon ve Yumurtlama Döneminde Kullanımı

PRIMEVAC IP3' ün anaç balıklarda uygulamasıyla

ilgili bir çalışma yapılmadığı için anaç balıklar PRIMEVAC IP3 ile aşılanmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Aşı uygulaması öncesindeki anestezi, boylama gibi manipülasyon süreçleri ve uygulamanın kendisinin yaratacağı stres nedeniyle, aşılamadan sonra balıklarda geçici bir iştah kaybı olabilir. Eğer başka bir yan etki görülmesi halinde veteriner hekim bilgilendirilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının başka herhangi bir veteriner tıbbi ürünle birlikte kullanıldığında güvenliği ve etkinliği hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir. 330 derece/gün (14 gün) öncesinde ve sonrasında başka aşıların kullanılmaması önerilir. Başka bir veteriner tıbbi ürün ile karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDÖT

Uygulama dozunun iki katı doz ile her bir hedef hayvanda yapılan yüksek doz çalışmalarında anormal, lokal ve sistemik reaksiyon gözlenmemiştir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILARI

Sıfır (0) derece / gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinen bir kontrendikasyon bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR

"Kendi kendine aşılamadan kaçınız."

"Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız."

"Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz."

"Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız."

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Uygulama esnasında uygulamanın kalite kontrolü bir veteriner hekim tarafından yapılmalıdır.

Kalibre edilmiş aşı tabancaları ve aşılama makinaları kullanılır. Otomatik aşı enjektörü kullanmak

Pazarlama İzin Sahibinin Adı - Adresi:

Vetal Hayvan Sağlık Ürünleri A.Ş.

Petrolsö Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRK YE

Telefon: +90 416 223 20 30 Faks: +90 416 223 14 56

e-mail: vetal@vetal.com.tr

web: www.vetal.com.tr

uygulayıcı tarafından birbiri ardına çok hızlı ve kontrolsüz yapılan aşılamaları, aşı dozunun tamamının karın boşluğuna zerk edilmemesi ve aşının kas içinde kalması gibi sonuçları azaltacaktır.

Ürün hamile personel tarafından uygulanmamalıdır.

Kullanıcının dikkatine; Kendi kendinize enjeksiyon yapmanız sonucunda enjeksiyon yaptığınız bölgede ağrı ve şişkinlik oluşabilir. Böyle bir durumda derhal tıbbi müdahaleye başvurunuz ve prospektüsü hekim ile paylaşınız.

Doktorun dikkatine; Kendi kendine enjekte edilen ürün yağ adjuvantlı bir birleşiktir. Özellikle uygulama alanında aşırı şişkinliğe sebep olabilir. Benzer ürünlerle yapılan kendi kendine aşılamalarda parmak kaybı ile sonuçlanan vakaların olduğu bilinmektedir. Enjekte edilen bölgenin cerrahi müdahale ile ensizyonu ve irigasyonu gerekebilir. İleri derece alerjenik vakalarda anafilaktik şoka kadar ilerleyebilecek sonuçlar doğabilir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Satılmak üzere paketlenmiş veteriner tıbbi ürününün raf ömrü 12 aydır. Ambalajı açılan ürünler 5 saat içerisinde kullanılmalıdır.

PRIMEVAC IP3 Aşısı (+2)°C ile (+8)°C arasında muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır. Dondurulmamalıdır ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürün ilgili mevzuata göre imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Her karton kutuda 10 adet alüminyum kapaklı ve bromobutil kauçuk tıpalı 500 ml'lik yüksek densite polietilen (HDPE) şişeler bulunmaktadır. Prospektüs karton kutu(dış ambalaj) içerisinde şişe adedi kadar sunulur.

Üretici Firma Adı ve Adresi

Vetal Hayvan Sağlık Ürünleri A.Ş.

Petrolsö Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRK YE

Telefon: +90 416 223 20 30 Faks: +90 416 223 14 56

e-mail: vetal@vetal.com.tr

web: www.vetal.com.tr