

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

VETAL PULMOVAC®

Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı

**Mycoplasma mycoides subsp. capri (BOT) ile hazırlanmış,
keçilerin ciğer ağrısı hastalığına karşı koruyucu attenüe, liyofilize canlı bir aşı**

BİLEŞİMİ:

1 doz (0.2 ml) aşıda;

Etkin Madde

Attenüe BQT *Mycoplasma mycoides subsp. capri*.....>2,5x10⁶ CFU

Yardımcı Maddeler:

Sığır beyini ve kalbi infüzyonu (BHI)	4,75 µl
İnaktif steril at serumu	4,75 µl
Yeast extract	0,5 mg
Penicilin G	0,5 IU
Thalium Acetate (Final Konsantrasyon)	4,9x10 ⁻⁵ g
Glukoz	0,15 mg/

Sulandırma Sıvısı:

NaCl	1.75 mg/doz
Enjeksiyonluk su	0.2 ml/doz

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Sağlıklı keçileri, bulaşıcı keçi ciğer ağrısı hastalığına karşı korumak amacıyla uygulanır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşı 6 aylıktan büyük keçilere 0,2 ml kulağın dış yüzeyine bağ dokusundan fakir, kulak ucundan 2–3 cm uzaklıktaki bölgeye deri altı uygulanır. Aşı gebelik döneminde doğuma 6 hafta kalana kadar uygulanabilir. 25 dozluk bir şişe liyofilizat 5 ml sulandırma sıvısı ile karıştırılarak kullanılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

AAşı, zorunlu olunmadıkça 6 aydan küçük oğlaklara uygulanmamalıdır. Aşılamada steril enjektör ve iğneler kullanılmalıdır. Enjeksiyon bölgesinin temiz ve kuru olmasına özen gösterilmelidir. Aşı uygulama kurallarına uyulmadığı takdirde kontaminasyona bağlı apseleşmeler görülebilir. Aşılamaya öncesi ve sonrası hayvanlar yaklaşık bir saat dinlendirilmelidir. Aşı, yalnızca sağlıklı hayvanlara uygulanır. Uygulama esnasında hayvanlar zapturapt altına alınması önerilir. Aşılar kullanmadan önce ve kullanım sırasında aralıklı olarak çalkalanmalıdır. Aşı uygulamaları esnasında asepsi ve antisepsiye uyulmalıdır.

Gebelik, laktasyon ve yumurtlama döneminde kullanım

Aşı gebeliğin son 6 haftasında olanlara uygulanmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Çok ender de olsa aşırı duyarlı hayvanlarda anafilaktik şok reaksiyonlarının gözlemlendiği durumlar gelişebilir. Bu durumda oluşan tablo; antiallerjik, adrenerjik ve antihistaminik preparatlarla kontrol altına alınabilir. Enjeksiyon bölgesinde uygulama sonrası görülen, apseleşmeyen ve birkaç hafta içinde kaybolan şişlikler normal aşı reaksiyonudur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının diğer tıbbi ürünlerle uyumluluğu üzerinde bilgi yoktur. Diğer tıbbi ürünlerle kullanıldığında (aynı gün ya da farklı zamanlarda) bu ürünün güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Herhangi bir tıbbi ürünle karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Normal aşı dozunun 10 katı keçilerde güvenli bulunmuştur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA YASAL ARINMA SÜRESİ:

Yasal arınma süresi aşılamadan sonra süt için 7 gün, et için asgari 28 gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:

Hasta veya inkübasyon periyodundaki hayvanlara, gebeliğin son 6 haftasında olanlara ve 6 aylık yaştan küçük keçilere aşı uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER:

Aşı uygulamaları sadece veteriner hekim veya veteriner hekim gözetimindeki teknisyenler tarafından yapılır. Uygulama sırasında koruyucu ekipmanlar (önlük, eldiven gibi) kullanılır. İyi hekimlik uygulaması gereğince aşılamaya başlamadan önce, göz ve giysilerin aşı materyali ile temasından kaçınılmalıdır. Aşı uygulayan veya hayvan zaptında görev yapan kişilerin yaralanması veya iğne batması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilerek doktor muayenesi yapılmalıdır. Aşının uygulama sahasına dökülmesi durumunda dökülen yer dezenfekte edilmelidir. Uygun koşullarda muhafaza edilmemiş, soğuk zinciri bozulmuş ve çalkalandığında homojen bir süspansiyon görünümü almayan aşılar kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Satışa sunulmuş haliyle raf ömrü: 12 ay

Sulandırma sıvısının raf ömrü: 24 ay

Aşılmış şişe raf ömrü: 6 saat

Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından

korunmalıdır. Dondurulmamalıdır.

Sulandırıcı, karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Kullanılmış ya da arta kalan ürünler tıbbi atık mevzuatı hükümleri gereği işlem görmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ:

25 dozluk liyofilize aşılar 5 ml sulandırma sıvısı ile birlikte ambalajlanmıştır. Liyofilize kısım ve sulandırma sıvısı için Tip I 8R nötr cam şişeler kullanılmıştır. Şişelerin ağzı butil plastikten yapılmış tıplar ve alüminyum kapaklar ile kapatılmıştır. Aşı adeti kadar prospektüs ilave edilmiş çoklu strafor kutuda pazara sürülür.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ:10.11.2004

Pazarlama İzin Sahibinin Adı Ve Adresi:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petro Mah. 14. Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30
Faks : +90 416 223 14 56
e-mail: vetal@vetal.com.tr
web: www.vetal.com.tr



Üretici Firma ve Adresi:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.
Petro Mah. 14. Cad. No:1 Organize Sanayi Bölgesi
Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30
Faks : +90 416 223 14 56
e-mail: vetal@vetal.com.tr
web: www.vetal.com.tr