



Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizati ve Sulandırıcısı Sığırlarda Trichophyton Verrucosum Aşısı

BİLEŞİMİ

TRICHOVAK; sığırlarda (buzağı dana, inek) Trichophytosis hastalığının önlenmesi ve tedavisinde kullanılan *T. verrucosum TF-130 sporları* ile hazırlanan; liyofilize, canlı bir aşıdır.
Her doz (sığır dozu, 4 ml) aşı içeriği:

Etkin Madde:

T. verrucosum TF-130 sporları 1,5 -12 x 10⁷

Yardımcı Maddeler:

Sükroz 125 mg
Jelatin 25 mg içerir

Sulandırma Sıvısı (4 ml);

Sodyum Klorür 32 mg, Potasyum Klorür 0,8 mg, Disodyum hidrojen fosfat 4,6 mg, Potasyum dihidrojen fosfat 0,8 mg ve enjeksiyonluk su (hacim tamamlayıcısı) içerir.

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik Grup:

ATCvet Kodu: QI02AP01 (Canlı Mantar Aşısı) Sığır Trichophyton Verrucosum Hastalığı Aşısı
TRICHOVAK aşısı, liyofilize formda attenüe *T. verrucosum TF 130* aşı suşu içerir. Aktif bağışıklığı-özellikle hücresel immüniteyi- uyarak, hem koruyucu hem de terapötik etki sağlar.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

TRICHOVAK; sığırlarda (buzağı dana, inek) Trichophytosis hastalığının önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Liyofilize aşı, sulandırma sıvısı ile eritilerek hazırlanır ve IM yolla uygulanır. Homojenize edilerek hazırlanan aşı, **profilaktik amaçla**; buzağılara 2 ml, dana ve sığırlara 4 ml, **terapötik amaçla**; buzağılara 4 ml, dana ve sığırlara 8 ml sağrı bölgesine kas içi yolla enjekte edilerek uygulanır. Uygulama sırasında enjeksiyon yeri tıraş edilir ve %70 lik alkol ile silinir. İkinci doz aşı 10-14 gün sonra aynı yere ve aynı dozda uygulanır. Ağır şekilde etkilenen hayvanlarda tekrar aşılamadan 2 hafta sonra üçüncü bir doz yapılabilir.

Hayvan Türü	Yaş	Aşı Dozu (ml)	
		Koruyucu Doz	Tedavi Dozu
Buzağı	<4 aya kadar	2+2	4+4
Dana/Sığır	>4 aydan büyük	4+4	8+8

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Sadece sağlıklı ve trichophite enfeksiyonu geçiren hayvanlara uygulanır. Aşırı zayıf, düşkün hayvanların aşılanmasından kaçınılmalıdır.

Aşılanan hayvanlarda antimikotik ilaçlar kullanılmamalıdır.

Uygulamada asepsi ve antisepsi kurallarına kesinlikle uyulmalı, iğne ve enjektörlerin tekrar kullanımından kaçınılmalıdır. Her hayvan ayrı bir enjektör veya iğne ucu kullanılarak aşılanmalıdır. Enjeksiyon yeri antiseptiklerle temizlendikten sonra aşı iyice çalkalanarak uygulanmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım

Gebe hayvanlar, doğumdan 1 ay öncesine kadar aşılanabilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Bazı hayvanlarda ikinci aşılamadan 10-15 gün sonra uygulama yerinde, büyüklüğü 20 mm çapına varan yüzeysel kabuklanmalar oluşabilir. Ancak ilaçla müdahale edilmemelidir. 20-25 gün sonra bu deri kabukları kendiliğinden düşer. Trikotitik kabukların incilmesi ve düşmesi ile gözlemlenen tedavi edici etki, ikinci aşıdan 15-30 gün geçtikten sonra görülür. Trikotitik kabukların düşmesini sağlamak amacıyla lezyonlara vazelin, balık yağı ve benzer yumuşatıcı sürülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının diğerleri ile uyumluluğu üzerinde bilgi yoktur. Diğer aşılarla kullanıldığında (aynı gün ya da farklı zamanlarda) bu ürünün güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Genel bir yaklaşımda aşının uygulanmasından 14 gün önce ve 14 gün sonrasında başka bir tıbbi ürünün uygulanması önerilmez.

Ürünün sulandırıcısı ve üretilen diğer komponentler dışında herhangi bir tıbbi ürünler karıştırılmaması önerilir.

DOZ AŞIMI, VARSA SEMPTOMLAR, ACİL PROSEDÜRLER, ANTİDOTLAR (gerekli ise)

10 doz aşı uygulaması yapılan hayvanlarda herhangi bir olumsuz bulgu gözlemlenmemiş olup; 10 doza kadar güvenli bir şekilde kullanılabilir. Nadiren de olsa anafilaktik reaksiyon gelişebilir. Bu durumda antihistaminikler verilmelidir.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA YASAL ARINMA SÜRESİ

Ette: Aşılanan hayvanlar 28 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir.

Sütte: Sıfır gün

KONTRENDİKASYONLAR

Aşı, genel olarak sistemik enfekte hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyaliyle temasından kaçınılmalıdır. Aşılama sırasında eldiven kullanılması önerilir. Aşı uygulaması sırasında genel biyogüvenlik tedbirlerine riayet edilmelidir.

MUHAFAZA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 24 aydır.

Sulandırıcının raf ömrü: 24 aydır.

Sulandırılan aşının raf ömrü: 2 saat

Liyofilize aşı; 2 – 8 °C'de saklanmalıdır ve güneş ışığından korunmalıdır.

Sulandırıcı karanlık ve kuru bir yerde 25°C'nin altında muhafaza edilmelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürünler otoklav edilerek, uygun bir dezenfektanla muamele edilerek, kaynatılarak veya yakılarak imha edilir. Tıbbi atıklarla ilgili ulusal mevzuatlara uygun hareket edilir. Hedef olmayan türler için özel bir önlem gerekmemektedir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

Karton kutusu içerisinde liyofilize bölümü 8R tip I nötr cam şişelerde 1, 2, 5, 10, 20 ve 40 dozluk olarak, çözücüsü tip II cam şişelerde ya da polipropilen plastik şişelerde sırasıyla 4 (10 ml), 8 (10 ml), 20 (20 ml), 40 (50 ml), 80 (100 ml) ve 160 ml (250 ml)'lik sulandırma sıvısı ile birlikte pazara sürülür. Tüm ambalaj formları aynı anda pazara sürülmeyebilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ:

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 27.05.2020

Pazarlama İzin Sahibi/ Üretici Firma Adı ve Adresi:

Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.

Petrolsob Mah.14.Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRKİYE

Telefon : +90 416 223 20 30 Faks : +90 416 223 14 56

e-mail : vetal@vetal.com.tr web : www.vetal.com.tr