

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

VETAL

PESTVAC K™

Enjeksiyonluk Çözelti Liyofilizatı ve Sulandırıcısı

Koyun ve keçilerde *Küçük ruminant vebası virüsü (PPR)* enfeksiyonlarına karşı canlı attenüe liyofilize aşı

BİLEŞİMİ

PESTVAC K koyun ve keçileri; küçük ruminant vebası enfeksiyonlarından korumak için kullanılan attenüe canlı aşıdır. Bir doz aşı (1 ml);

Etkin Madde:

Küçük ruminant vebası virüsü Nigeria-75/1 suşu $DKID_{50} \geq 10^{2.5}$

İMMUNOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakoterapötik Grup:

ATCvet Kodu: QI04AD (Keçi ve koyunlarda canlı viral aşılar)

PPR virusuyla yapılan aşılamalarda güçlü bir humoral yanıt ortaya çıkar. Aynı zamanda hücrel immun yanıtın da koruyucu düzeyde uyarıldığı belirlenmiştir. PPR için de bağışıklığın uzun süreli olabileceği bilinmektedir. Aşıda yer alan virusun attenüe etken olması, bu virusun vücutta çoğalarak güçlü bir bağışıklık oluşturmalarının temel nedenidir. Etkenlerden PPR virusu negatif polariteli bir RNA virusudur.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLAR

Her yaştaki koyun ve keçileri; küçük ruminant vebası (PPR) hastalığına karşı korumak ve hastalığın sebep olduğu mortalite, klinik bulguların azaltılması amacıyla kullanılır. Aşılama sonrası bağışıklık 3 hafta içinde başlar, en az 12 ay devam eder.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Aşı her yaş, cinsiyet ve ırktan koyun ve keçiye tek doz olarak uygulanır. PESTVAC K aşısının uygulama dozu derialtı yolla 1 mL'dir. Aşı; koyunlara yünsüz ve hareketsiz koltuk altı bölgesinden, keçilere ise koltuk altı yanında kuyruk bölgesinin kılsız kesiminden gerekli antisepsi kurallarına uyularak uygulanır. Tekrar aşılama (rapel doz) aralığı 1 yıldır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Aşı sadece sağlıklı hayvanlara uygulanmalıdır. Ateşli veya klinik bulgu gösteren hayvanlara aşı uygulaması yapılmamalıdır. Yoğun stres ve kötü bakım koşulları aşidan elde edilecek bağışıklığın beklenen düzeylere ulaşmasını engelleyebilir.

İmmün sistemi baskılayıcı ilaçlar ve kortikosteroidlerle eş veya yakın zamanlı kullanılmamalıdır. Bu durumda aşidan beklenen korunma düzeyi sağlanamayabilir. Bu etki bazı antibiyotiklerle tedavi sürecindeki hayvanlarda da ortaya çıkabilir.

Sulandırılan aşı peletinin tamamen eritilmesi ve dikkatlice homojenizasyonu sağlanmalıdır. Uygulamada asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalıdır. Her hayvan ayrı bir enjektör veya ayrı bir iğne ucu kullanılarak aşılanmalıdır.

Kuzular ve oğlaklar da hastalığa duyarlı olduğu için aşılama programına dâhil edilmelidir. Aşılı ya da hastalığı geçiren annelerden doğan ve kolostrum alan yavrular 3 ay aşılanmamalıdır. Ancak hastalığın yeni çıktığı bölgelerde ve daha önce virusla karşılaşmamış aşısız annelerden doğan yavrular için acil aşılama programı uygulanabilir.

Gebelik, Laktasyon ve Yumurtlama Döneminde Kullanımı

Gebe hayvanlarda kullanımı güvenlidir. Aşının laktasyonda kullanımıyla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Genel bir yaklaşım olarak hayvanların koç/teke katımı öncesinde aşılanması tavsiye edilir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Aşılama sonrası geçici bir ateş yükselmesi ile uygulama bölgesinde sert veya yumuşak şişliklerin oluşması normal aşı reaksiyonu olarak kabul edilir. Çok seyrek de olsa bazı durumlarda ferdi olarak anafilaktik reaksiyonlar görülebilir. Bu reaksiyonlar gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonları şeklinde ortaya çıkabilir. Bu tür vakaların beklenme oranı %0,01-0,1 aralığındadır. Aşılama yapılan hayvanların takip edilmesi lokal veya genel reaksiyon gösterenlerin ayrılarak Veteriner Hekim gözetiminde anti-allerjik tedaviye alınması önerilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bu aşının diğer aşılarla uyumluluğu üzerine bilgi bulunmamaktadır. Diğer aşılarla birlikte kullanıldığında (aynı gün ya da farklı zamanlarda) bu ürünün güvenliği ve etkinliği bilinmemektedir. Diğer tıbbi ürünlerle bir arada ya da karıştırılarak kullanılmaması önerilir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Normal aşı dozunun 100 katı koyun ve keçilerde güvenli bulunmuştur.

GIDA DEĞERİ OLAN HAYVANLARDA KALINTI UYARILAR

0 (Sıfır) gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Bilinen bir kontrendikasyonu bulunmamaktadır.

GENEL UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN ÖNERİLER

Bu ürün, sadece Veteriner Hekim ya da Veteriner Hekim gözetiminde Veteriner Sağlık Teknisyenleri tarafından uygulanmalıdır. Uygulayıcılar için aşı içeriğinden kaynaklanabilecek direkt bir biyolojik risk bulunmamaktadır. Ancak iyi hekimlik uygulaması gereğince aşılama sırasında cilt, göz ve giysilerin aşı materyaliyle temasından kaçınılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Ürünün satışa sunulmuş hali ile raf ömrü: 24 aydır.

Sulandırıcının raf ömrü: 24 aydır.

Sulandırılan aşının raf ömrü: 2 saat

PESTVAC K Aşısı, (+2) ila (+8) °C aralığında muhafaza edilir. Direkt güneş ışığından korunmalıdır.

Sulandırıcı; karanlık ve kuru bir yerde, 25 °C'nin altında buzdolabına konulmadan, dondurulmadan muhafaza edilmelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmış veya arta kalan ürünler otoklav edilerek, uygun bir dezenfektanla muamele edilerek, kaynatılarak veya yakılarak imha edilir. Tıbbi atıklarla ilgili ulusal mevzuatlara uygun hareket edilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ

PESTVAC K aşısı münferit karton kutularda veya kutusuz olarak strafor viallerde liyofilize bölümü 4R tip I nötr cam şişelerde 25, 50 ve 100 dozluk olarak, çözücüsü tip II cam şişelerde ya da polipropilen plastik şişelerde sırasıyla 25, 50 ve 100 ml'lik sulandırma sıvısı ile birlikte pazara sürülür. Şişeler bütül plastikten yapılmış tapa ve alüminyum kapakla kapatılmıştır. Tüm ambalaj formları aynı anda pazara sürülmeyebilir.

Ürünün prospektüsü karton kutulu ürünlerde kutunun içine eklenir. Karton kutusuz olarak strafor kutularında gönderilen ürünlerde ise strafor kutusu içindeki ürün adedi kadar prospektüs gönderilip her ürünle birlikte birer adet prospektüs verilir.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 02.12.2022

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ: 10.11.2004

Pazarlama İzni Sahibinin Adı ve Adresi:

VETAL HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ A.Ş.
Petrolosb Mah.14. Cad. No:1/1 Adıyaman /TÜRKİYE
Telefon : +90 416 223 20 30 / Faks : +90 416 223 14 56
e-mail : vetal@vetal.com.tr / web: www.vetal.com.tr

Üretici Firma Adı ve Adresi:

VETAL HAYVAN SAĞLIĞI ÜRÜNLERİ A.Ş.
Petrolosb Mah. 14. Cad. No: 1/1 Adıyaman/TÜRKİYE